

ATTENTION :

Il existe de nombreuses contre-indications à l'IRM. Si vous êtes porteur d'un dispositif médical implantable (pacemaker, défibrillateur, neurostimulateur, etc.) des précautions particulières doivent être prises avant la réalisation de l'examen.

Veillez le signaler à votre médecin et à la prise de rendez-vous. Une recherche de compatibilité doit être faite afin d'établir une fiche qui déterminera les précautions à prendre pour la réalisation de l'examen en toute sécurité. Pour toute question ou recherche concernant un dispositif médical implantable, contactez-nous par mail à l'adresse suivante :

compatibilite.irm@humani.be



Hôpital André Vésale

Rue de Gozée, 706
6110 Montigny-le-Tilleul

Hôpital Civil Marie Curie

Chaussée de Bruxelles, 140
6042 Lodelinsart

Centre de Santé des Fagnes

Bd Louise, 18
6460 Chimay

*Pour toute question,
et prise de rendez-vous,
contacter le secrétariat
d'imagerie au*

 071/92 08 00



IRM MAMMAIRE




www.humani.be



Une brochure *Imagerie par résonance magnétique (IRM)* est également disponible et vous informe des principes et précautions. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant de lire celle-ci.

Une IRM mammaire permet de caractériser la nature d'une lésion découverte lors d'un bilan sénologique. Elle permet également de vérifier l'intégrité des prothèses mammaires ou encore de pratiquer un dépistage chez des personnes à risques.



DÉROULEMENT DE L'EXAMEN :

L'IRM mammaire dure plus ou moins 20 minutes. Aucune précaution n'est à prendre avant l'examen.

Injection de produit de contraste

Une voie d'entrée (cathéter) sera mise en place afin d'injecter un produit de contraste permettant d'avoir une meilleure qualité d'image. De rares effets secondaires peuvent être ressentis comme une chaleur dans tout le corps ainsi qu'un goût métallique en bouche.

L'injection est :

- *Contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère*
- *Contre-indiquée en cas d'allergie sévère connue*
- *En cas de réaction allergique légère connue, l'injection peut avoir lieu si une prémédication a été suivie au préalable quelques jours avant*

Vous êtes allongée sur le ventre, chaque sein positionné dans une antenne spécifique permettant la réalisation des images.

Il est impératif de rester immobile pendant toute la durée de l'examen afin d'avoir des images de qualité suffisante.



APRÈS L'EXAMEN :

Vous pouvez partir en suivant les recommandations du personnel soignant. La perfusion sera enlevée et un pansement compressif sera placé. Vous pouvez le retirer après 15 minutes.

- **Hydratation :** nous vous recommandons de bien vous hydrater après cet examen. Cela permet à votre organisme d'éliminer plus facilement et rapidement le produit de contraste par les urines.

GROSSESSE :

La réalisation d'une IRM chez une femme enceinte est possible. Cependant, il est préférable de le réaliser uniquement en cas de nécessité absolue.

