

## ATTENTION :

Si vous êtes porteur d'un dispositif médical implantable (pacemaker, défibrillateur, neurostimulateur, etc.) des précautions particulières doivent être prises avant la réalisation de l'examen. Veuillez le signaler à votre médecin et à la prise de rendez-vous. Une recherche de compatibilité doit être faite afin d'établir une fiche qui déterminera les précautions à prendre pour la réalisation de l'examen en toute sécurité.

Pour toute question ou recherche concernant un dispositif médical implantable, contactez-nous par mail à l'adresse suivante :

[compatibilite.irm@humani.be](mailto:compatibilite.irm@humani.be)



## INFORMATIONS :

### Hôpital André Vésale

Rue de Gozée, 706  
6110 Montigny-le-Tilleul

### Hôpital Civil Marie Curie

Chaussée de Bruxelles, 140  
6042 Lodelinsart

### Centre de Santé des Fagnes

Bd Louise, 18  
6460 Chimay

*Pour toute question,  
et prise de rendez-vous,  
contacter le secrétariat  
d'imagerie au*

☎ 071/92 08 00



[www.humani.be](http://www.humani.be)

12351294

MC298-6 dépliant-3v imagerie médicale



## IRM COLONNE

(Cervicale/Dorsale/Lombaire)



Une brochure **Imagerie par résonance magnétique (IRM)** est également disponible et vous informe des principes et précautions. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant de lire celle-ci.

L'IRM de la colonne est l'un des examens les plus demandés. On peut réaliser des IRM de la colonne cervicale, dorsale et lombaire. Cet examen permet de rechercher des pathologies telles qu'une hernie discale, un pincement discal, etc.



### Déroulement de l'examen

L'IRM d'une colonne dure 10 minutes. C'est un examen rapide et indolore.

### Injection de produit de contraste (Gadolinium)

Il est possible qu'une voie d'entrée (cathéter) soit mise en place pour injecter un produit de contraste qui permettra une meilleure qualité d'image.

De rares effets secondaires peuvent être ressentis comme une chaleur dans tout le corps ainsi qu'un mauvais goût en bouche.

### L'injection est :

- ▶ Contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère
- ▶ Contre-indiquée en cas d'allergie sévère connue
- ▶ En cas de réaction allergique légère connue, l'injection peut avoir lieu si une prémédication a été suivie 3 jours précédant l'examen. (Le plan de désensibilisation vous est remis à l'accueil ou envoyé au domicile avec les médicaments à vous faire prescrire par votre médecin).

**Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les instructions fournies :** votre collaboration est cruciale afin d'obtenir des images interprétables et de qualité optimale. On vous demandera de rester immobile pendant tout l'examen.

Vous serez couché sur le dos, en cas de besoin, des coussins sont disponibles pour votre confort.



### Après l'examen

Vous pouvez partir en suivant les recommandations du personnel soignant. Si une perfusion a été mise en place, celle-ci sera enlevée et un pansement compressif sera placé. Vous pouvez le retirer après 15 minutes.

- **Hydratation** : En cas d'injection, nous vous recommandons de bien vous hydrater après cet examen. Cela permet à votre organisme d'éliminer plus facilement et rapidement le produit de contraste par les urines.

### GROSSESSE :

La réalisation d'une IRM chez une femme enceinte est possible.

Cependant, il est préférable de le réaliser uniquement en cas de nécessité absolue.

