

GROSSESSE :

La grossesse est une contre-indication aux rayons X. L'examen ne pourra être réalisé qu'en cas de nécessité absolue.



RISQUES LIÉS AUX RADIATIONS IONISANTES :

Pour tous les examens radiologiques les doses sont maintenues les plus faibles possibles permettant un examen de qualité en minimisant le risque induit.



Hôpital André Vésale

Rue de Gozée, 706
6110 Montigny-le-Tilleul

Hôpital Civil Marie Curie

Chaussée de Bruxelles, 140
6042 Lodelinsart

Centre de Santé des Fagnes

Bd Louise, 18
6460 Chimay

*Pour toute question,
et prise de rendez-vous,
contacter le secrétariat
d'imagerie au*

 071/92 08 00



CT – scanner

Plus d'informations sur
notre site internet



www.humani.be

TE0064 - 3




ARTHROSCANNER



Une brochure CT scanner (tomodensitométrie) est également disponible et vous informe des principes et précautions. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant de lire celle-ci.

Le CT Arthroscanner permet d'explorer l'ensemble d'une articulation en un temps très court et d'en reconstruire des images en 3D.



DÉROULEMENT DE L'EXAMEN :

Prévoyez d'être là 10 minutes à l'avance (encodage au secrétariat) sans oublier la prescription médicale. Sans celle-ci, votre examen ne pourra pas être réalisé. Vous devez être à jeun de **4 heures**.

POSITIONNEMENT ET PRÉPARATION :

Cet examen se réalise en deux parties. Chacune durant plus ou moins 10 minutes.

Il vous sera demandé de retirer les vêtements concernant la région à examiner ainsi que les bijoux et piercings éventuels.

La première partie se déroule en salle de radiographie. Une fois installé correctement, le médecin radiologue réalisera une injection de produit de contraste iodé dans l'articulation concernée.

Les règles strictes d'asepsie sont respectées. Cela peut être douloureux lors de l'introduction de l'aiguille mais une fois l'examen terminé, vous ne sentirez qu'une légère gêne due au produit se trouvant dans l'articulation.

La deuxième partie se déroule au scanner, celle-ci est très rapide. Vous serez installé sur la table d'examen, la position dépend de la région du corps à explorer. Il est très important de bien rester immobile lors de l'acquisition des images.

INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE IODÉ :

Aucun effet secondaire immédiat n'est ressenti lors de l'injection du produit en intra articulaire.

- ▶ Contre indiqué en cas d'allergie sévère connue
- ▶ En cas de réaction allergique légère connue, l'injection peut avoir lieu si une prémédication a été suivie les 3 jours précédents l'examen. (Le plan de désensibilisation vous est remis à l'accueil ou envoyé au domicile avec les médicaments à vous faire prescrire par votre médecin)

APRÈS L'EXAMEN :

Vous pouvez partir en suivant les recommandations du personnel soignant.

