


C'est un petit cathéter central qui est placé dans une veine du bras au-dessus du pli du coude et qui arrive dans une veine de gros calibre (la veine cave supérieure).

Hôpital Civil Marie Curie

Chaussée de Bruxelles 140
6042 Lodelinsart

En cas de questions,
n'hésitez pas à contacter
l'angiographie au service
de radiologie au
☎ 071/ 92 08 24



PICCLINE



www.humani.be





Certains médicaments irritants doivent être injectés dans des veines de gros calibre ce que permet une picline qui a l'avantage de pouvoir rester en place plusieurs semaines, voire quelques mois, cela dépendra du traitement et de votre état de santé.

Cette picline permet d'éviter les perfusions multiples dans le bras et comme elle est souple elle n'empêchera aucun mouvement de votre bras.

Il existe des picline à une, deux ou trois voies (de 1 à 3 lumières).

Les indications sont multiples :

- ➔ perfusion de médicaments, transfusions
- ➔ nutrition parentérale
- ➔ prise de sang

L'implantation se fait en salle de radiologie interventionnelle sous simple anesthésie locale en ponctionnant une veine du bras avec l'aide d'un échographe

L'intervention dure une dizaine de minutes, durant laquelle vous pourrez poser toutes les questions nécessaires. Vous pourrez ensuite rentrer chez vous.

Ce qui n'est PAS permis avec un PICC :

- Pose d'une manchette pour la prise de la tension artérielle au bras du PICC.
- prendre de bain ou aller nager à moins que vous ne puissiez garder votre bras au sec.
- Charger lourdement votre bras (soulever des poids, appui prolongé, etc).

Si l'emplacement de la picline est rouge, gonflé ou douloureux prévenez l'équipe médicale (le médecin qui vous a prescrit l'examen).

