

ATTENTION :

Il existe de nombreuses contre-indications à l'IRM. Si vous êtes porteur d'un dispositif médical implantable (pacemaker, défibrillateur, neurostimulateur, etc.) des précautions particulières doivent être prises avant la réalisation de l'examen.

Veillez le signaler à votre médecin et à la prise de rendez-vous. Une recherche de compatibilité doit être faite afin d'établir une fiche qui déterminera les précautions à prendre pour la réalisation de l'examen en toute sécurité. Pour toute question ou recherche concernant un dispositif médical implantable, contactez-nous par mail à l'adresse suivante :

compatibilite.irm@humani.be



Hôpital André Vésale

Rue de Gozée, 706
6110 Montigny-le-Tilleul

Hôpital Civil Marie Curie

Chaussée de Bruxelles, 140
6042 Lodelinsart

Centre de Santé des Fagnes

Bd Louise, 18
6460 Chimay

*Pour toute question,
et prise de rendez-vous,
contacter le secrétariat
d'imagerie au*

 071/92 08 00



www.humani.be



**IRM
DE LA MOELLE ÉPINIÈRE**



Une brochure *Imagerie par résonance magnétique (IRM)* est également disponible et vous informe des principes et précautions. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant de lire celle-ci.



L'IRM de moelle épinière est un examen d'imagerie qui va permettre de vérifier si le canal médullaire est sain, s'il n'y a pas d'infection, de pathologies inflammatoires ou autres.

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN :

L'IRM de la moelle épinière dure plus ou moins 20 minutes. Vous serez positionné sur le dos, avec un casque au-dessus de la tête.



INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE :

Il est possible qu'une voie d'entrée (cathéter) soit mise en place afin d'injecter un produit de contraste pour avoir une meilleure qualité d'image. De rares effets secondaires peuvent être ressentis comme une chaleur dans tout le corps ainsi qu'un mauvais goût en bouche.

L'injection est :

- Contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère
- Contre-indiqué en cas d'allergie sévère connue
- En cas de réaction allergique légère connue, l'injection peut avoir lieu si une prémédication a été suivie au préalable quelques jours avant

Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les instructions fournies : votre collaboration est cruciale afin

d'obtenir des images interprétables et de qualité optimale. On vous demandera de rester immobile pendant toute la durée de l'examen.

APRÈS L'EXAMEN :

Vous pouvez partir en suivant les recommandations du personnel soignant. Si une perfusion a été mise en place, celle-ci sera enlevée et un pansement compressif sera placé. Vous pouvez le retirer après 15 minutes.

- **Hydratation :** En cas d'injection, nous vous recommandons de bien vous hydrater après cet examen. Cela permet à votre organisme d'éliminer plus facilement et rapidement le produit de contraste par les urines.

GROSSESSE :

La réalisation d'une IRM chez une femme enceinte est possible. Cependant, il est préférable de le réaliser uniquement en cas de nécessité absolue.

