

RISQUES LIÉS AUX RADIATIONS IONISANTES :

Pour tous les *examens radiologiques* les doses sont maintenues les plus faibles possibles permettant un *examen de qualité* en minimisant le risque induit.

Numéro de téléphone général :

 071/92 08 00

REJOIGNEZ LE
RÉSEAU SANTÉ
WALLON



Les images
médicales ne sont
pas des photos de
vacances



Pour en savoir plus

- Une brochure Radiologie conventionnelle – Généralités est également disponible et vous informe des principes et précautions. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant de lire celle-ci.



RX ŒSOPHAGE, ESTOMAC, DUODÉNUM / TRANSIT



www.humani.be
12351300



L'OED est un **examen radiologique** qui permet d'étudier l'**œsophage**, l'**estomac** et le **duodénum**. Il se réalise en buvant un produit de contraste baryté ou iodé. L'examen est réalisé par un médecin radiologue.

Cet examen permet de mettre en évidence des **troubles de la déglutition**, un **reflux gastro-œsophagien**, une **hernie hiatale**, une **fistule** ou encore des **ulcères**.

Il est souvent prescrit en **post opératoire** après une gastroplastie, un bypass ou encore une sleeve.



DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

Prévoyez d'être là **10 minutes à l'avance** (encodage au secrétariat) sans oublier votre **carte d'identité** et la **prescription médicale**. Sans celle-ci, votre examen ne pourra pas être réalisé.

Vous devez être **à jeun de 4 heures**.

POSITIONNEMENT ET PRÉPARATION

L'examen dure **environ 30 minutes**. Il n'est pas douloureux. Si votre médecin demande à examiner votre **transit**, l'examen dure **quelques heures** en fonction de la vitesse de celui-ci.

Il vous sera demandé d'être en sous-vêtements et t-shirt ou de porter une blouse d'examen, et d'enlever tout objet métallique au niveau du cou et du thorax. Vous serez **installé debout** sur la table d'examen.

Ensuite, le radiologue vous demandera d'avaler plusieurs gorgées du **produit de contraste** pendant l'acquisition des images. Il est très important de bien suivre les **recommandations** du médecin pendant l'ingestion du produit de contraste.

POUR LE TRANSIT

Les premières images sont **réalisées directement** après l'ingestion du produit. Ensuite, de nouvelles radios seront prises à **différents intervalles** jusqu'à l'opacification complète de l'intestin grêle.

APRES L'EXAMEN

Il est possible que vous souffriez de **diarrhée** ou **constipation** selon le produit ingéré. Il est conseillé de **bien s'hydrater** après l'examen.

GROSSESSE



La grossesse est une contre-indication aux rayons X. L'examen ne pourra être réalisé qu'**en cas de nécessité absolue**.



Êtes-vous enceinte ou susceptible de l'être ?



ÉVITEZ LES RAYONS
PENDANT LA
GROSSESSE

