### **GROSSESSE:**

La réalisation d'une IRM chez une femme enceinte est possible. Cependant, il est préférable de le réaliser uniquement en cas de nécessité absolue.



### **ATTENTION:**

Il existe de nombreuses contre-indications à l'IRM. Si vous êtes porteur d'un dispositif médical implantable (pacemaker, défibrillateur, neurostimulateur, etc.) des précautions particulières doivent être prises avant la

réalisation de l'examen.

Veuillez le signaler à votre médecin et à la prise de rendez-vous. Une recherche de compatibilité doit être faite afin d'établir une fiche qui déterminera les précautions à prendre pour la réalisation de l'examen en toute sécurité. Pour toute question ou recherche concernant un dispositif médical implantable, contactez-nous par mail à l'adresse suivante :

compatibilite.irm@humani.be



## Hôpital André Vésale

Rue de Gozée, 706 6110 Montigny-le-Tilleul

### **Hôpital Civil Marie Curie**

Chaussée de Bruxelles, 140 6042 Lodelinsart

# Centre de Santé des Fagnes

Bd Louise, 18 6460 Chimay

Pour toute question, et prise de rendez-vous, contacter le secrétariat d'imagerie au

**(**) 071/92 08 00





www.humani.be




IRM PELVIENNE



Une brochure Imagerie par résonnance magnétique (IRM) est également disponible et vous informe des principes et précautions. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant de lire celle-ci.

L'IRM pelvienne est un examen d'imagerie médicale permettant d'observer les organes situés au niveau du petit bassin (l'utérus, la vessie, les ovaires, la muqueuse utérine aussi appelée l'endomètre, la prostate et le rectum).

L'utilisation de cette IRM est recommandée pour diagnostiquer et suivre les anomalies et les maladies inhérentes à ces différents organes.





### **DÉROULEMENT DE** L'EXAMEN:

L'IRM dure entre 15 et 30 minutes.

Il est parfois préconisé de faire un petit lavement évacuateur au domicile afin d'être bien préparé à l'examen.

Vous serez positionné sur le dos, avec une « ceinture » au niveau du pelvis.

### **INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE:**

Il est possible qu'une voie d'entrée (cathéter) soit mise en place afin d'injecter un produit de contraste ou un autre médicament afin d'avoir une meilleure qualité d'image. De rares effets secondaires peuvent être ressentis comme une chaleur dans tout le corps ainsi qu'un mauvais goût en bouche.

#### L'injection est :

- Contrindiquée en cas d'insuffisance rénale sévère
- Contrindiquée en cas d'allergie sévère connue
- En cas de réaction allergique légère Injection d'antispasmodique

L'antispasmodique peut être administré per os (par voie orale) ou par voie intraveineuse. Cela permet de limiter les

mouvements des intestins lors d'IRM centrée dans cette région.

L'antispasmodique est :

- Contrindiqué en cas de Glaucome
- Contrindiqué en cas d'hypertrophie de la prostate
- Contrindiqué en cas d'allergie connue

Afin d'avoir une meilleure visualisation des différentes cavités pelviennes, une opacification vaginale et/ou rectale peut avoir lieu. Avec votre accord, le technologue introduira une canule reliée à une seringue de gel dans l'anus et/ou le vagin.

Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les instructions fournies : votre collaboration est cruciale afin d'obtenir des images interprétables et de qualité optimale. On vous demandera de rester immobile et parfois d'interrompre votre respiration pendant quelques secondes.

### **APRÈS L'EXAMEN:**

Vous pouvez partir en suivant les recommandations du personnel soignant. Si une perfusion a été mise en place, celle-ci sera enlevée et un pansement compressif sera placé. Vous pouvez le retirer après 15 minutes.

Hydratation: En cas d'injection, nous vous recommandons de bien vous hydrater après cet examen. Cela permet à votre organisme d'éliminer plus facilement et rapidement le produit de contraste par les urines.