





L'existence de douleurs pelviennes chroniques associées à des varices utéro-ovariennes est appelé syndrome de congestion pelvienne. Ces douleurs s'aggravent en fin de journée, en position debout ou après une activité intense, et peuvent être accompagnées de dyspareunie (douleurs pendant les rapports sexuels) et/ou de varices des membres inférieurs.

Hôpital Civil Marie Curie

Chaussée de Bruxelles 140
6042 Lodelinsart

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter service de radiologie-angiographie :

📞 071/ 92 08 24



EMBOLISATION DE VARICES PELVIENNES



www.humani.be





L'embolisation consiste à obturer (emboliser) les veines ovariennes ou pelviennes. L'examen sera réalisé sous anesthésie locale, car il s'agit d'une intervention rapide (30 min) et peu douloureuse. Elle débute par une ponction d'une veine fémorale, afin d'y introduire une sonde, qui est ensuite dirigée par le médecin radiologue dans la veine ovarienne. Celle-ci sera embolisée à l'aide de petits ressorts métalliques (coils voir photo) et rarement de mousses sclérosantes. L'embolisation est bilatérale.

RISQUES DE L'EMBOLISATION

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité, comporte un risque de complication qui dans ce type d'intervention est très faible.

- ➔ Migration du matériel d'embolisation (dans des cas très rares)
- ➔ Au niveau du point de ponction, il peut se produire un hématome qui se résorbera en deux ou trois semaines.
- ➔ L'injection peut entraîner une réaction d'intolérance au produit de contraste iodé. C'est généralement transitoire et sans gravité. Une réaction plus sévère se traduit par des troubles cardio-respiratoires et nécessite un traitement.
- ➔ Risques liés aux radiations ionisantes : Pour tous les examens radiologiques les doses sont maintenues les plus faibles possibles permettant un examen de qualité en minimisant le risque induit.

APRÈS L'INTERVENTION

La patiente ressort le jour même de l'intervention (hospitalisation ambulatoire de quelques heures). En cas de douleurs (inconfort pelvien) un traitement classique anti-inflammatoire/antidouleur peut être pris.

Durant quelques jours il ne faudra pas faire de sport intensif.

En cas de problème, prenez contact avec votre médecin prescripteur qui est celui qui connaît le mieux votre dossier médical.

Apportez le jour de l'examen : la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, ...), la liste écrite des médicaments que vous prenez, le dossier radiographique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM), tous vos résultats d'examen concernant la coagulation et autres analyses.

RECOMMANDATIONS :

Vous devez signaler à votre médecin ou au service de radiologie interventionnelle de Marie Curie : la prise de médicaments (anticoagulants, antiagrégants ou de la Metformine). Tout risque de grossesse. Les allergies (produit de contraste iodé, pansement, etc...). Ces derniers vous donneront les instructions quant à l'arrêt ou le changement éventuel de la médication ainsi que la préparation à suivre pour réaliser l'examen.

